

Vitamin B12, Methylmalonsäure und Holo-TC

Vitamin B12-Mangel ist **häufiger** als bisher angenommen (7% bei jungen, 30% bei älteren **gesunden** Menschen)! Es gibt **keinen Einzelparameter**, mit dem eine zuverlässige Diagnostik eines Vitamin B12-Mangels möglich ist. Nach neueren Erkenntnissen bietet eine kombinierte Diagnostik von Vitamin B12, Methylmalonsäure (MMS) und Holotranscobalamin (HoloTC) mehr Sicherheit und Aussagekraft (Vitamin B12-Symposium in Stuttgart, 2013).

Makrozytäre Anämie mit erhöhtem MCV und erniedrigtem Hämoglobin sind klassische Symptome eines Vitamin B12-Mangels, die jedoch nicht immer vorhanden sind. Häufiger kommen neurologische Erscheinungen ohne Blutbildveränderungen vor:

mangelnde körperliche Ausdauer, Gang- und Standunsicherheit, Sturzneigung, Parästhesien, Konzentrationsstörungen, Demenz, psychotische Störungen, Apathie.

Weitere Symptome: Zungenbrennen, Tinnitus/Ohrgeräusche, rote Lackzunge, Mundwinkelrhagaden, Atrophie der Vaginalschleimhaut.

Ursachen eines Vitamin B12-Mangels:

- vegetarische, vegane, makrobiotische Ernährung
- Malabsorption, Maldigestion
- chronisch atrophische Gastritis (ältere Patienten), ungenügende intestinale Resorption
Alkoholismus
- Mangel an Intrinsic Faktor
- Zöliakie, M. Crohn
- Parasitenbefall, z.B. Fischbandwurm
- angeborene Vitamin B12-Transportstörung
- Pankreasinsuffizienz, chronische Leber- und Nierenerkrankungen
- Medikamente: **Protonenpumpen-Hemmer, H2-Rezeptor-Antagonisten**, Antazida, Metformin, sowie Medikamente, die mit Cobalamin interagieren: Gichtmittel Colchicin, Lipidsenker Colestyramin, Antiepileptika, Methyldopa sowie Antibiotika wie Aminoglykoside, Neomycin und Chloramphenicol
- vermehrter Bedarf z.B. bei nitrosativem Stress, Stillzeit, Autoimmunerkrankungen, HIV

Serum-Diagnostik:

Insbesondere die Frühdiagnostik eines Vitamin B12-Mangels erfordert sensitivere Parameter. Durch eine frühzeitige Vitamingabe kann die Entwicklung hämatologischer und insbesondere neurodegenerativer Erkrankungen verhindert werden!

Vitamin B12	Serum	normal bis erniedrigt	Limitierte Spezifität und Sensitivität, bereits bei Werten im unteren Referenzbereich kann ein Vitamin B12-Mangel nicht sicher ausgeschlossen werden!
Methylmalonsäure (MMA)	Serum	erhöht (!)	Frühindikator eines intrazellulären, funktionellen Vitamin B12-Mangels. Besteht ein Mangel an zellulärem Cobalamin, kommt es zu einer vermehrten Abgabe von MMA ins Blut. Bis zu 40% (!) bessere Sensitivität als bei isolierter Messung von Vitamin B12 ! Falsch hohe Werte durch Niereninsuffizienz.
Methylmalonsäure	2.Morgen-Urin	erhöht(!)	Siehe Methylmalonsäure (Serum)! Der Wert wird auf Kreatinin bezogen. Falsch hohe Werte durch Niereninsuffizienz.
Holo-Transcobalamin	Serum	erniedrigt	Stadium der Speicherentleerung; Sensitivität liegt zwischen Vitamin B12 und MMA, falsch hohe Werte bei Niereninsuffizienz und unter B12-Substitution.
Homocystein	NaF	erhöht	Homocysteinanstieg auch bei Folat- und Vitamin B6-Mangel

Erniedrigte Holo-TC-Werte in Verbindung mit erhöhter Methylmalonsäure (MMA) (> 300 nmol/l) und erhöhten Homocysteinspiegeln (> 10 µmol/l), beides funktionelle Indikatoren eines Vitamin-B12-Mangels, weisen auf einen metabolisch manifesten Vitamin-B12-Mangel hin.

Niereninsuffizienz und Vitamin B12-Mangel:

Patienten mit chron. Niereninsuffizienz haben auch ohne Vitamin B12-Mangel erhöhte MMA-, Homocystein- und Holo-TC-Werte. Da MMA ausschließlich über die Nieren ausgeschieden wird, kann eine eingeschränkte Nierenfunktion (vorwiegend ältere Patienten) zu auffälligen Werten von Methylmalonsäure im Serum und im Urin führen. Die Reduktion der MMA-Konzentration durch Cobalamin-Injektionen um mehr als 200 nmol/l (therapeutische MMA-Absenkung) bestätigt den B12-Mangel bei Niereninsuffizienz.

Weitere Labordiagnostik zur Abklärung der Ursache eines Vitamin B12-Mangels:

großes Blutbild (hohes MCV!), Auto-AK gegen Intrinsic-Faktor und Parietalzellen, Helicobacter-Antigen im Stuhl, Gastrin (hohe Werte bei Achlorhydrie), Zöliakie-Antikörper, Pankreaselastase im Stuhl, Stuhl auf Parasiten/Würmer.

Lit.: Labor und Diagnose, Thomas, 8.Aufl.2012; Der Allgemeinarzt, 2014;36(10) S.551-56.

Anforderung:	Vitamin B12		
Material:	1 ml Serum		
Untersuchungshäufigkeit:	Mo - Fr täglich		
Abrechnung:	GOÄ 1,15 (Privat):	16,76 €*	(4140)
	GOÄ 1,0 (IGeL):	14,57 €	(4140)
	EBM:	4,20 €	(32373)
Anforderung:	Methylmalonsäure		
Material:	1 ml Serum oder 2. Morgenurin		
Untersuchungshäufigkeit:	zweimal pro Woche		
Abrechnung:	GOÄ 1,15 (Privat):	60,33 €*	(4210)
	GOÄ 1,0 (IGeL):	52,46 €	(4210)
	EBM:	51,90 €	(32314)
Anforderung:	Holo-Transcobalamin		
Material:	1 ml Serum		
Untersuchungshäufigkeit:	zweimal pro Woche		
Abrechnung:	GOÄ 1,15 (Privat):	21,45 €*	(4062)
	GOÄ 1,0 (IGeL):	18,65 €	(4062)
	EBM:	<u>keine</u> Leistung nach EBM	
Anforderung:	Homocystein		
Material:	NaF		
Untersuchungshäufigkeit:	Mo - Fr täglich		
Abrechnung:	GOÄ 1,15 (Privat):	16,76 €*	(A3742)
	GOÄ 1,0 (IGeL):	14,57 €	(A3742)
	EBM:	15,00 €	(32318)

*zzgl. einmalige Auslagen nach §10 der GOÄ

Ansprechpartner:

Frau Dr. med. H. Raith

Telefon:089 54308-0